

Pengaruh Substitusi Konsentrat Dengan Tepung Maggot Terhadap Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Pakan Ayam Broiler

by Rumah Publikasi Ilmiah

Submission date: 16-Jan-2021 10:59AM (UTC+0700)

Submission ID: 1488474288

File name: jurnal_luthfi.docx (293.89K)

Word count: 2164

Character count: 12815



The Effect Of Concentrate Subtitusion with Maggot Flour on Addition of Agency Weight and Broiler Chicken Feed Conversion

Pengaruh Subtitusi Konsentrat Dengan Tepung Maggot Terhadap Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Pakan Ayam Broiler

Muhammad Luthfi Budianto ¹, Dyanovita Alkurnia ², Arif Arya Hertanto ³

^{1,2,3} Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran No. 53 Lamongan

email: ¹dyanovita_alkurnia@yahoo.com

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima 24 Januari 2020
Direvisi 30 April 2020
Diterima 2 Desember 2020
Tersedia online xxx

Kata kunci:

Konsentrat
Tepung Maggot
Pertambahan Bobot Badan
Konversi Pakan
Ayam Broiler

Keyword:

Concentrate
Maggot Flour
Weight Gain
Feed Conversion
Broiler Chicken

Budianto, M. L., Alkurnia, Dyanovita., Hertanto, A. A. (2020). "Pengaruh Subtitusi Konsentrat Dengan Tepung Maggot Terhadap Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Pakan Ayam Broiler," International Journal of Animal Science Universitas Islam Lamongan, vol. 6, no. 1, pp. 1-10, 2020.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat pengaruh substitusi konsentrat dengan tepung maggot terhadap pertambahan bobot badan dan konversi pakan ayam broiler. Materi menggunakan DOC umur 3 hari sebanyak 36 ekor, pakan yang dipakai ialah konsentrat dengan merek MALINDO 8202-R, tepung maggot, jagung, dan bekatul dengan Perlakuan P0 Konsentrat 30%, bekatul 10%, jagung 60%, maggot 0%, P1 Konsentrat 20%, bekatul 10%, jagung 60%, maggot 10%, P2 Konsentrat 10%, bekatul 10%, jagung 60%, maggot 20%, P3 Konsentrat 0%, bekatul 10%, jagung 60%, maggot 30%. Metode penelitian ialah RAL (Rancangan Acak Lengkap) menggunakan 4 perlakuan dan 3 kali ulangan. Pada tiap perlakuan digunakan 9 ekor ayam dan di setiap perlakuan digunakan 3 ulangan dan disetiap ulangan isi dengan 3 ekor ayam. Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata dan standar deviasi pertambahan bobot badan harian ayam broiler. Analisis ragam memperlihatkan bahwa penambahan tepung maggot tidak berpengaruh nyata ($P>0.05$) terhadap pertambahan bobot badan. Pada penelitian yang telah dilakukan menggunakan perlakuan P0 (0%), P1 (10%), P2 (20%), P3 (30%) diperoleh hasil rerata pertambahan bobot badan ayam broiler dengan perlakuan $27.02 \pm 0,30$ (P0), $27.30 \pm 0,31$ (P1), $27.54 \pm 0,11$ (P2), $27.35 \pm 0,36$ (P3). Sedangkan hasil konversi pakan memperlihatkan hasil menggunakan komersil dengan penambahan tepung maggot dengan taraf pemberian P0 (0%), P1 (10%), P2 (20%), P3 (30%), yang nilai konversinya terendah ialah P1 ($0,79 \pm 0,00$) sedangkan nilai konversi tertinggi adalah P0 sebesar ($0,83 \pm 0,02$). Secara numeric antar perlakuan terdapat perbedaan dalam variable konversi pakan, hal ini terlihat pada nilai konversi pakan P1 ($0,79 \pm 0,00$), P2 ($0,79 \pm 0,02$), P3 ($0,80 \pm 0,03$), P0 ($0,83 \pm 0,02$).

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of concentrate substitution with maggot flour on body weight gain and feed conversion of broiler chickens. The material uses DOC aged 3 days as many as 36 tails, the feed used is concentrate with the brand MALINDO 8202-R, maggot flour, corn, and bran with 30% P0 Concentrate Treatment, 10% bran, 60% corn, 0% maggot, P1 concentrate 20%, 10% bran, 60% corn, 10% maggot, 10% concentrated P2, 10% bran, 60% corn, 20% maggot, 0% P3 concentrate, 10% bran, 60% corn, 30% maggot. The research method was CRD (completely randomized design) using 4 treatments and 3 replications. In each treatment 9 chickens were used and in each treatment 3

replicates were used and in each repetition the contents were with 3 chickens. From the research results obtained the mean and standard deviation of daily body weight gain in broiler chickens. Analysis of variance showed that the addition of maggot flour had no significant effect ($P > 0.05$) on body weight gain. In research that has been carried out using treatment P0 (0%), P1 (10%), P2 (20%), P3 (30%), the results obtained that the average body weight gain of broilers with treatment is 27.02 ± 0.30 (P0), 27.30 ± 0.31 (P1), 27.54 ± 0.11 (P2), 27.35 ± 0.36 (P3). While the feed conversion results showed the results using commercial use with the addition of maggot flour with the level of giving P0 (0%), P1 (10%), P2 (20%), P3 (30%), the lowest conversion value was P1 (0.79 ± 0.00) while the highest conversion value is P0 (0.83 ± 0.02). Numerically between treatments there are differences in the feed conversion variable, this can be seen in the feed conversion value P1 (0.79 ± 0.00), P2 (0.79 ± 0.02), P3 (0.80 ± 0.03), P0 (0.83 ± 0.02).

© 2020 Animal Science with CC BY SA license.

1. Pendahuluan

Banyaknya permintaan pasar akan ayam broiler menjadi potensi besar untuk megembangkan usaha peternakan ayam broiler. Meningkatnya permintaan pasar dari tahun ke tahun menjadi salah satu peluang yang dapat memberi keuntungan dalam industri peternakan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Peternakan (2013), di Indonesia pada tahun 2012 jumlah ayam pedaging mencapai 1.177.990.870 ekor dan pada tahun 2013 naik menjadi 1.244.402.020 ekor.

Maggot ialah larva lalat *black soldier* atau serangga bunga yang mempunyai tekstur kenyal serta mampu mengeluarkan enzim alami, sehingga bahan yang awalnya tidak mudah dicerna bisa disederhanakan serta bisa digunakan oleh ayam. Selain itu maggot mengandung protein yang cukup tinggi, yakni kisaran 42% (Saurin 2005; Retnosari, 2007). Kelebihan maggot lainnya yakni mengandung antimikroba serta antijamur, sehingga jika dimakan oleh ikan akan memperkuat daya tahan tubuh dari ancaman penyakit bakterial serta jamur.

kandungan protein yang tinggi pada belatung dari lalat *black soldier fly* (*Hermetia illucens*) belum menjadi jaminan tingginya tingkat ketersediaan protein yang ada didalamnya. Tinggi rendahnya tingkat ketersediaan (availabilitas) protein bisa terlihat dari nilai kecernaannya. Kecernaan suatu bahan pakan ialah cerminan dari tinggi rendahnya nilai guna dari bahan pakan. Nilai kecernaan yang rendah, memperlihatkan nilai guna yang rendah juga, sedangkan jika nilai kecernaannya tinggi maka nilai gunanya tinggi pula. Upaya penggantian konsentrat dengan tepung maggot akan lebih menunjukkan nilai guna jika nilai kecernaannya diketahui.

Perlunya mengetahui kecernaan guna mencapai efisiensi pemakaian pakan dalam ransum yang diberikan. Hal tersebut tak dapat lepas dari kandungan energi serta protein dalam ransum yang amat mempengaruhi konsumsi pakan. Berdasar dari itu, untuk mengurangi biaya pakan diperlukan bahan baku pakan alternatif yang lebih ekonomis harganya serta mengandung protein tinggi sesuai kebutuhan unggas, terkhusus ayam broiler. Salah satu alternative yang dapat digunakan ialah mengganti konsentrat dengan pemakaian tepung maggot. Selain itu maggot mempunyai kandungan protein yang tinggi (Bondari & Sheppard) menyatakan bahwa dalam bentuk kering maggot memiliki kandungan 41-42% protein kasar, 14-15% abu, 31-35% ekstrak eter, 0,60-0,63% fospor dan 4,8-5,1% kalsium. Dengan demikian, penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui pengaruh substitusi konsentrat dengan tepung maggot terhadap pertambahan bobot badan dan konversi ayam broiler.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan pada february hingga maret 2020, di kandang peternakan milik Robbi Erik Susanto di Desa Bronjong, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Penelitian memakai Rancangan Acak Lengkap dengan menggunakan 4 perlakuan serta 3 kali ulangan. Di tiap perlakuan digunakan 9 ekor ayam dan disetiap perlakuan digunakan 3 ulangan dan disetiap ulangan diisi dengan 3 ekor ayam. Materi yang digunakan ialah ayam broiler umur 3 hari (DOC) *Strain* Malindo super

sejumlah 50 ekor, dengan bobot rerata 40 gram/ekor. Variable yang diukur meliputi penambahan bobot badan (PBB) dan Feed Convention Ratio (FCR). Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan sidik ragam sesuai pola rancangan acak lengkap serta uji jarak Duncan.

3. Hasil dan Diskusi

Pertambahan bobot badan ialah selisih dari bobot akhir (panen) dengan bobot badan awal pada waktu tertentu. Hasil penelitian mengenai pengaruh substitusi konsentrat dengan maggot terhadap ayam broiler.

Tabel 1. Pengaruh Substitusi Konsentrat Dengan Maggot Terhadap Ayam Broiler

Variabel Pengamatan	Perlakuan			
	P0	P1	P2	P3
PBB(gr/ekor/hari)	27.02± 0,30	27.30± 0,31	27.54± 0,11	27.35± 0,36

Berdasar dari hasil penelitian, diperoleh rataan serta standar deviasi penambahan bobot badan harian ayam broiler. Analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan tepung maggot tidak berpengaruh nyata ($P>0.05$) terhadap penambahan bobot badan. Pertambahan bobot badan diketahui dari selisih bobot badan minggu akhir dengan bobot badan awal (selama waktu penelitian). Pada penelitian yang telah dilakukan menggunakan perlakuan P0 (0%), P1(10%), P2(20%), P3(30%) memperoleh hasil rata-rata penambahan bobot badan ayam broiler dengan perlakuan 27.02 ± 0,30(P0), 27.30± 0,31(P1), 27.54 ± 0,11(P2), 27.35 ± 0,36(P3), secara numeric substitusi konsentrat dengan tepung maggot terhadap penambahan bobot badan tertinggi secara brurutan adalah P2 (20% tepung maggot) dengan penambahan bobot badan (27,54 ±0,11), P3 (30% tepung maggot) dengan penambahan bobot badan (27,35 ± 0,36), P1 (10% tepung maggot) dengan penambahan bobot badan (27,30±0,31), P0 (0% tepung maggot) dengan penambahan bobot badan (27,02±0,30). Hal ini berarti substitusi nyata pada konsentrat dengan penambahan tepung maggot sebesar 20% memperoleh hasil penambahan bobot badan paling tertinggi, pada penambahan tepung maggot 10% memperoleh hasil penambahan bobot badan mengalami kenaikan namun lebih rendah dibandingkan penambahan tepung maggot sebanyak 20%, pada penambahan tepung maggot sebesar 30% memperoleh hasil penambahan bobot badan mengalami kenaikan, namun pertambahan pertambahan lebih lambat dibandingkan dengan penambahan tepung maggot sebesar 20%, sedangkan pada perlakuan tanpa penambahan tepung maggot penambahan bobot badan tidak stabil. Penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, Sandy (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwasanya penambahan tepung maggot sebesar R0(0%) R1(25%) R2(50%) R3(75%) R4(100%) tanpa memberikan efek buruk terhadap penambahan bobot badan ayam broiler dengan hasil terbaik R3 dengan taraf pemberian tepung maggot sebesar 75% yang memperoleh hasil berbeda nyata ($P<0.05$).

Faktor yang mempengaruhi bobot badan adalah sifat individu, baik sifat kualitatif ataupun sifat kuantitatif ditentukan oleh gen serta alelnya yang terdiri dari pasangan DNA yang ada dalam sel. Dua Kopi DNA yang sempurna menentukan gambaran serta sifat pengembangan tubuh (Sidadolog, 2011). Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan bobot badan ayam ialah nutrisi pakan yang diberikan, sependapat dengan North (1978) bahwasanya kurva pertumbuhan ternak amat bergantung pada pakan yang diberi, apabila pakan memiliki kandungan gizi yang tinggi maka ternak bisa mengapai bobot badan tertentu diumur yang lebih muda.

Untuk melihat pengaruh penambahan tepung maggot terhadap penambahan bobot badan menggunakan ANOVA.

Tabel 2. Hasil Uji ANOVA Pengaruh Penambahan Tepung Maggot Terhadap Pertambahan Bobot Badan

	PBB				
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.409	3	.136	1.668	.250
Within Groups	.654	8	.082		
Total	1.064	11			

Terlihat dari tabel 2 ANOVA diatas pertambahan berat badan hal ini berarti tidak meunjukkan pengaruh yang nyata terhadap pertambahan bobot badan, ini menunjukkan bahwa F hitung kurang dari F table ($P>0,05$). Sesuai dengan penelitian hartadi, dkk (1986) bahwa system pemberian pakan yang didasarkan zat-zat makanan yang dicerna lebih baik, ini dikarenakan bahan pakan yang memiliki daya cerna tinggi memiliki kemampuan dalam meminimalkan zat-zat makanan yang terbuang. Hasil penelitian tidak terdapat pengaruh yang nyata pada pertambahan bobot badan dikarenakan (1) Kandungan nutrisi pakan antara perlakuan tidak berbeda terlalu jauh. (2) Diduga kandungan protein yang terdapat pada maggot telah hilang selama prosesing/ pengeringan oleh matahari. Menurut Qurniawan (2016) bahwa factor yang mempengaruhi pertambahan bobot badan ialah jenis kelamin, konsumsi pakan, lingkungan, bibit serta kualitas pakan.

Konversi pakan

Data konversi pakan (%) ditunjukkan dalam tabel 3.

Tabel 3. Data Konversi Pakan (%)

Variabel Pengamatan	Perlakuan			
	P0	P1	P2	P3
Konversi Pakan (%)	0,83±0,02	0,79±0,00	0,79±0,02	0,80±0,03

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan telah diperoleh rataan dan standar deviasi konversi pakan harian ayam broiler pada umur 3-28 hari seperti yang tertera pada tabel 3 bahwasanya penelitian ini mendapatkan hasil menggunakan komersil dengan penambahan tepung maagot dengan taraf pemberian P0 (0%), P1 (10%), P2 (20%), P3 (30%), yang nilai konversinya terendah adalah P1 (0,79±0,00) sedangkan nilai konversi tertinggi adalah P0 sebesar (0,83±0,02). Secara numeric antar perlakuan terdapat perbedaan dalam variable konversi pakan, hal ini terlihat pada nilai konversi pakan P1 (0,79±0,00), P2 (0,79 ± 0,02), P3 (0,80 ± 0,03), P0 (0,83 ± 0,02). Hal ini diduga pemberian tepung maggot dapat menurunkan konsumsi pakan akan tetapi karena kandungan protein tepung maggot yang cukup tinggi dapat meningkatkan pertambahan bobot badan, tepung maggot memiliki sifat atau ciri yang khas, sehingga dapat menambah nafsu makan dan dapat menambah Bobot Badan pada ternak. Sifat yang khas tepung maggot antara lain (1) memiliki aroma yang khas dan disukai oleh ternak, (2) memiliki warna coklat terang seperti dedak padi.

Untuk menentukan perbedaan dengan melakukan uji lanjut menggunakan anova.

Tabel 4. Hasil Uji ANOVA Pengaruh Penambahan Tepung Maggot Terhadap Konversi Pakan Ayam

	Broiler				
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	.003	3	.001	2.811	.108
Within Groups	.003	8	.000		
Total	.006	11			

Berdasarkan data hasil analisis yaitu angka pada F tabel ($P>0,05$) sehingga pemberian tepung maggot tidak berpengaruh nyata. Karena kemungkinan feed conversion ratio dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni usia ternak, bangsa, kandungan nutrisi ransum, kondisi suhu serta keadaan ternak, penatalaksanaan serta pemakaian bibit yang baik. Selain itu feed conversion ratio juga di pengaruhi oleh faktor lingkungan seperti pendapat oleh Lacy dan Vest (2000), bahwasanya genetik, kualitas

ransum, penyakit, suhu, kebersihan kandang, aliran udara, pengobatan, serta pengelolaan kandang merupakan beberapa faktor utama yang mempengaruhi konversi ransum ialah.

Makin kecil nilai konversi pakan, artinya makin efisien kemampuan ternak dalam mencerna pakan, sehingga makin dikit pula pakan yang diperlukan untuk mengapai pertambahan persatu kilogram bobot badan (Hidayat 2012). Faktor lain yang mungkin diduga turut mempengaruhi hasil penelitian pada variable konversi pakan tidak berbeda nyata adalah karena bobot badan ternak dan konsumsi pakan antar perlakuan tidak berbeda.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan bisa diambil kesimpulan bahwasannya pemberian tepung maggot tidak memberikan pengaruh nyata ($p>0,05$) terhadap pertambahan bobot badan dan konversi pakan ayam broiler.

Pengaruh Substitusi Konsentrat Dengan Tepung Maggot Terhadap Pertambahan Bobot Badan dan Konversi Pakan Ayam Broiler

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

3%

2

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

2%

3

repo.unand.ac.id

Internet Source

2%

4

worldwidescience.org

Internet Source

1%

5

zombiedoc.com

Internet Source

1%

6

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

7

media.unpad.ac.id

Internet Source

1%

8

repository.ub.ac.id

Internet Source

1%

9	ojs.uho.ac.id Internet Source	1%
10	Agung R. P. Rumondor, B. Tulung, A. Rumambi, C.A Rahasia. "PENGARUH PENGGANTIAN JAGUNG DENGAN SORGUM Cv. KAWALI DALAM RANSUM PELLET TERHADAP PERFORMANS KELINCI LOKAL", ZOOTEK, 2018 Publication	1%
11	123dok.com Internet Source	1%
12	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
13	Imelda Boki. "Pengaruh Pakan Komersial Terfermentasi EM4 terhadap Pertambahan Bobot Badan, Konsumsi Pakan, dan Konversi Pakan Ayam Broiler", JAS, 2020 Publication	1%
14	industria.ub.ac.id Internet Source	1%
15	sutir.sut.ac.th:8080 Internet Source	1%
16	docslide.us Internet Source	1%
17	docplayer.net	

Internet Source

1%

18

eksakta.ppj.unp.ac.id

Internet Source

1%

19

Irfan Danis Woro, Umiyati Atmomarsono, Rina Muryani. "Pengaruh Pemeliharaan pada Kepadatan Kandang yang Berbeda Terhadap Performa Ayam Broiler", Jurnal Sain Peternakan Indonesia, 2019

Publication

<1%

20

garuda.ristekbrin.go.id

Internet Source

<1%

21

jpi.faterna.unand.ac.id

Internet Source

<1%

22

repository.unair.ac.id

Internet Source

<1%

23

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

<1%

24

repositori.usu.ac.id

Internet Source

<1%

25

Siti Muntasiroh, Cahyono Purbomartono, Dini Siswani Mulia. "Kombinasi Ekstrak Rumput Laut Cokelat (*Padina* sp.) Dan Vitamin C Melalui Pakan Terhadap Imun Non-Spesifik Lele Dumbo (*Clarias gariepinus*)", Sainteks, 2020

<1%

26 repository.usu.ac.id <1 %
Internet Source

27 ejournal.unib.ac.id <1 %
Internet Source

28 F. Yunitasari, L.D. Mahfudz, I. Mangisah.
"Pengaruh Penggunaan Limbah Cair
Pemindangan Ikan dalam Ransum terhadap
Efisiensi Penggunaan Protein Itik Persilangan
Mojosari Peking Fase Pertumbuhan", Jurnal
Sain Peternakan Indonesia, 2019
Publication

29 repository.unikama.ac.id <1 %
Internet Source

30 Yurni Sari Amir, Prima Silvia Noor, Sujatmiko
Sujatmiko, Nelzi Fati, Toni Malvin. "Pengaruh
Pemberian Tanaman Obat Sebagai Feed
Additive Dalam Ransum Terhadap Performa
dan Organ Pencernaan Ayam Pedaging",
Journal of Livestock and Animal Health, 2020
Publication

31 Vanessa Rambat, J. F. Umboh, Y. L.R. Tulung,
Y. H.S. Kowel. "KECERNAAN PROTEIN DAN
ENERGI RANSUM BROILER YANG
MENGUNAKAN TEPUNG MAGGOT
(HERMETIA ILLUCENS) SEBAGAI

PENGGANTI TEPUNG IKAN", ZOOTEK, 2015

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off