

Pengaruh Pemberian Tepung Kedelai pada Pakan terhadap Pertambahan Bobot Badan Mencit

by Rumah Publikasi Ilmiah

Submission date: 15-Oct-2020 11:06AM (UTC+0300)

Submission ID: 1415838530

File name: M._Arifudin_-_Copy.docx (120.28K)

Word count: 2201

Character count: 12842



Available online

Journal Page is available at <http://animalsciencejournal.unisla.ac.id/index.php/asj/index>.

10

The Effect of Soybean Flour on Feed on the Weight Gain of Mice

Pengaruh Pemberian Tepung Kedelai pada Pakan terhadap Pertambahan Bobot Badan Mencit

M. Arifudin¹, Wahyuni^{2*}, Qabilah Cita K.N.S³^{1,2,3} Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Islam Lamongan
Jl. Veteran No. 53 Lamongan
email: yunipeternakan@gmail.com,

INFO ARTIKEL

Sejarah artikel:

Diterima 24 Nopember 2020
Direvisi 20 Desember 2020
Diterima 30 Desember 2020
Online 01 Januari 2020

Kata kunci:

Konsumsi, Mencit,
Pertambahan Bobot Badan,
Tepung Kedelai.

Keyword:

Consumption, Mice,
Weight Gain,
Soybean Flour.

APA style in citing this article:

M. Arifudin, Wahyuni, dan Q. C. K. N. Sumarsono,
"Pengaruh Pemberian Tepung Kedelai pada Pakan terhadap Pertambahan Bobot Badan Mencit,"
Animal Science : Vol. 03 (01)
2020 Halaman 1-5

ABSTRAK

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai 21 Juli 2019. Penelitian dilaksanakan dikandang milik pribadi, berlokasi di Jl. Laras-Liris No.18 Lamongan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian tepung kedelai (*Glycine max*) pada pakan terhadap pertumbuhan bobot badan mencit (*Mus musculus*). Kegunaan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengusaha peternakan mencit dapat meningkatkan produktifitas mencit dan menambah pemasukan. Materi yang dipakai pada penelitian ini yakni ternak Mencit (*Mus musculus*) sebanyak 60 ekor umur 28 hari. Penelitian memakai metode Rancangan Acak Lengkap, yang terdiri atas 4 perlakuan dan 3 pengulangan. Adapun 4 perlakuan tersebut terdiri dari P₀: pakan komersial 100% tanpa penambahan tepung kedelai, P₁: Pakan komersial 95% + 5% tepung kedelai, P₂: Pakan komersial 90% + 10% tepung kedelai, P₃: Pakan komersial 85% + 15% tepung kedelai. Setiap taraf perlakuan mendapat 3 ulangan dengan setiap ulangan terdiri dari 5 ekor mencit. Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah pertambahan bobot badan pada mencit. Analisis data menggunakan metode statistik Rancangan Acak Lengkap. Penimbangan mencit dilakukan 1 minggu sekali setiap sore. Berdasarkan hasil analisis ragam dapat diketahui bahwa pemberian tepung kedelai dalam pakan tidak berpengaruh nyata (P>0.05) pada pertambahan bobot badan mencit. Ini memperlihatkan bahwa pemberian tepung kedelai dalam pakan tidak memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan pakan kontrol. Hal ini dikarenakan komposisi nutrisi pakan perlakuan tidak berbeda jauh dengan pakan kontrol, sehingga tidak berpengaruh nyata (P>0.05) terhadap pertambahan bobot badan dan konsumsi mencit.

ABSTRACT

The research was conducted from 1 July to 21 July 2019. The analysis was carried out in a private property located on Jl. Laras-Liris No.18 Lamongan. This research aimed to determine the effect of giving soy flour (*Glycine max*) to the feed on the growth of the bodyweight of mice (*Mus musculus*). The usefulness of this research is expected to be beneficial for the mouse farm entrepreneurs to increase mice's productivity and increase income. The material used in this research is 60 mice (*Mus musculus*) cattle aged 28 days. The study used a completely randomized design method consisting of 4 treatments and three repetitions. The four treatments consist of P₀: 100% commercial feed without the addition of soy flour, P₁: 95% commercial feed + 5% soybean flour, P₂: 90% commercial feed + 10% soy flour, P₃: 85% + 15% commercial feed soy flour. Each treatment level received three replications, with each replica consisting of 5 mice.

The variable observed in this study was body weight gain in mice. Data analysis used statistical methods, a completely randomized design. Weighing the mice is done once a week every afternoon. Based on the results of the study of variance, it can be seen that the provision of soy flour in the feed has no significant effect ($P > 0.05$) on the weight gain of mice. This shows that giving soy flour in the feed does not provide better results than control feed. This was because the treated feed's nutritional composition was not much different from the control feed, so it had no significant effect ($P > 0.05$) on body weight gain and consumption of mice.

© 2020 Animal Science with CC BY SA license.

1. Pendahuluan

Mencit (*Mus musculus*) merupakan hewan yang biasa dipakai dalam penelitian laboratorium sebagai hewan coba, yakni sekitar 40-80% (Aditya, 2006). Mencit mempunyai banyak kelebihan sebagai hewan coba (khususnya dipakai dalam penelitian biologi), yakni siklus hidup yang cenderung pendek, perkembangbiakan jumlah anak banyak, ragam sifat-sifatnya tinggi serta mudah dalam pengembangannya (Fransius, 2008). Mencit (*Mus musculus*) masuk kedalam bagian kelompok kerajaan hewan animalia. Karakteristik hewan ini meliputi jinak, takut sinar, aktif saat malam hari, mudah bereproduksi, siklus hidup yang pendek, serta termasuk golongan poliestrus (Fransius, 2008).

Pakan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dari suatu usaha peternakan yakni 70% dari total biaya pemeliharaan. Pemberian salah satu pakan alternatif sumber protein tinggi adalah untuk memproduksi produksi mencit yang maksimal dengan mempertimbangkan kebutuhan tenaga serta protein ransum yang diberikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan bahan pakan yang bersumber protein tinggi secara maksimal dengan menjadikan bahan tersebut sebagai pemberian pakan tambahan untuk ternak.

Kedelai merupakan hasil yang diperoleh dari suatu usaha pertanian dengan kandungan nutrisi yang cukup tinggi yakni protein 34%, lemak 18,1%, karbohidrat 34,8%, Ca 227%, fosfor 585%, besi 8%, vitamin 10%, vitamin B 1,1% dan air 7,5% (Napitupulu, 2012). Tepung kedelai bersumber dari biji kedelai dengan cara dikeringkan setelah itu dihaluskan serta diayak hingga diperoleh tepung kedelai yang halus. Tingkat degradabilitas tepung kedelai sebesar 75% dan yang tidak terdegradasi sebesar 25% (Prasetyono, 2008).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melihat pengaruh pemberian tepung kedelai pada pakan terhadap pertumbuhan bobot badan mencit.

2. Metode

Pelaksanaan penelitian selama 21 hari yaitu tanggal 1 Juli sampai tanggal 21 Juli 2019. Pemeliharaan selama penelitian dilakukan di kandang yang beralamatkan Jl. Laras – Liris No.18 Lamongan. Ternak yang digunakan adalah Mencit (*Mus musculus*) sebanyak 60 ekor umur 28 hari dengan jenis kelamin betina dengan bobot awal rata-rata 20gram/ekor. Kandang yang digunakan adalah bak plastik berbentuk kotak dengan ukuran 40 x 25 x 10 cm. Pada masing-masing kandang dilengkapi dengan penutup yang dibuat dari kayu dan kawat ram. Tiap kandang diberi tempat makan serta tempat minum. Alas kandang menggunakan limbah serutan kayu. Pakan yang dipergunakan ialah pakan komersial ayam pedaging umur 0 – 20 hari dengan merek dagang HI-PRO-VITE BRI CP 511B yang dibuat oleh PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk.

Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah dengan 4 macam perlakuan (P_0 , P_1 , P_2 , P_3) digunakan dalam penelitian ini. Setiap taraf perlakuan mendapat 3 pengulangan dengan tiap pengulangan terdiri atas 5 ekor mencit dengan jenis kelamin betina. Perlakuan tersebut antara lain:

- P_0 : pakan komersial 100% tanpa tepung kedelai.
- P_1 : pakan komersial 95% + 5% tepung kedelai.
- P_2 : pakan komersial 90% + 10% tepung kedelai.
- P_3 : pakan komersial 85% + 15% tepung kedelai.

Variabel Pengamatan yang diamati yakni:

- a) Pertambahan Bobot Badan (PBB)

Pertambahan bobot badan harian mencit dihitung menggunakan rumus:

$$PBBH = \frac{B-A}{L}$$

Keterangan:

B : Bobot badan akhir A : Bobot badan awal L : Lama pemeliharaan

b) Konsumsi Pakan (g/ekor/hari)

Konsumsi pakan = pakan yang diberikan (g/ekor/hari) – pakan yang tersisa (g/ekor/hari).

3. Hasil dan Pembahasan

Konsumsi Pakan

Data hasil rataan konsumsi mengenai pengaruh pemberian tepung kedelai pada pakan terhadap konsumsi mencit (*mus musculus*), disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1. Rataan Konsumsi Mencit (*mus musculus*).

Perlakuan	Ulangan			Total	Rata-rata
	1	2	3		
P ₀	68,66	68,79	68,85	206,30	68,77 ± 0,10
P ₁	68,79	68,78	71,01	208,58	69,53 ± 1,28
P ₂	70,96	70,94	68,69	210,59	70,20 ± 1,30
P ₃	68,59	68,92	68,61	206,12	68,71 ± 1,19

Keterangan : Data Primer Diolah (2019).

Berdasarkan hasil rataan konsumsi, pengaruh pemberian tepung kedelai pada pakan terhadap konsumsi pakan mencit (*mus musculus*) dengan taraf yang berbeda yaitu: P₀ (tanpa pemberian tepung kedelai), P₁ (95% pakan komersial + 5% tepung kedelai), P₂ (90% pakan komersial + 10% tepung kedelai), P₃ (85% pakan komersial + 15% tepung kedelai) menunjukkan bahwa konsumsi pakan dari urutan tertinggi yaitu pada : P₂ (70,20 ± 0,30) gram/ekor, P₁ (69,53 ± 1,28) gram/ekor, P₀ (68,77 ± 0,10) gram/ekor dan P₃ (68,71 ± 1,19) gram/ekor. Ini diperkirakan sebab komposisi gizi pakan perlakuan tidak berbeda jauh sehingga tidak berpengaruh terhadap konsumsi pakan. Dari hasil analisis sidik ragam tentang pengaruh pemberian tepung kedelai pada pakan terhadap konsumsi mencit (*mus musculus*) disajikan dalam tabel 2.

Tabel 2. Analisis ragam konsumsi pakan pada mencit (g/ekor/hari).

SK	DB	JK	KT	F hit	F tabel	
					5%	1%
Perlakuan	3	4,48	1,49			
Galat	8	6,79	0,85	1,76	4,07	7,59
Total	11	11,27				

Keterangan: F_{hitung} < F_{tabel} 0,05 artinya tidak berpengaruh nyata.

Berdasarkan Tabel 2. diatas dapat diketahui bahwa pemberian tepung kedelai pada pakan hingga taraf 15% (P₃) tidak berbeda nyata F_{hitung} < F_{tabel} (5%) artinya Terima H₀ dan Tolak H₁. Hal ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh pemberian tepung kedelai terhadap konsumsi.

Napitupulu (2012), menyatakan tepung kedelai mempunyai kandungan protein 34%, lemak 18,1%, karbohidrat 34,8%, Ca 227%, fosfor 585%, besi 8%, vitamin 10%, vitamin B 1,1% dan air 7,5%, sedangkan konsentrasi mempunyai kandungan Kadar air 13%, Protein 23%, Lemak 5%, Serat 5%, Abu 7%, Calsium 0,9%, Phosphor 0,6%, Aflatoxin 50ppb dan M.E 3000Kcal/kg (PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk, 2019). Kandungan nutrisi memperlihatkan bahwa kandungan yang terdapat pada tepung kedelai memang tinggi akan tetapi suhu pada kandang diperkirakan terlalu tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Houpt dan Wolski, (1982; dalam Mahendra, 2006) bahwa temperatur lingkungan yang tinggi, ketidakseimbangan konsumsi asam amino, kadar

estrogen dalam tubuh yang tinggi serta keadaan saluran merupakan faktor yang dapat menurunkan konsumsi pakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi mencit antara lain adalah temperatur, selera, palatabilitas pakan, bobot badan, bentuk pakan serta usia ternak. Dari data yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat konsumsi pakan antara P0, P1, P2, serta P3 tidak terdapat perbedaan nyata.

Pertambahan Bobot Badan

Pertambahan bobot badan pada mencit (*mus musculus*) diperoleh melalui hasil penimbangan bobot badan akhir dikurangi bobot badan awal penimbangan. Penimbangan bobot badan dilaksanakan di awal dan akhir periode. Rata-rata penambahan bobot badan mencit selama penelitian terdapat pada tabel 3.

Tabel 3. Rataan pertambahan bobot badan mencit (gram/ekor/minggu).

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rataan
	1	2	3		
P0	9,56	8,62	9,78	27,96	9,32 ± 0,62
P1	9,13	9,10	9,13	27,36	9,12 ± 0,02
P2	9,34	9,33	9,28	27,95	9,32 ± 0,03
P3	9,24	9,06	8,88	27,18	9,06 ± 0,18

Sumber : Data Primer yang Diolah (2019).

Data tabel 3 memperlihatkan bahwa pertambahan bobot badan harian mencit (*mus musculus*) paling tinggi yaitu 9,32 g/ekor/hari pada mencit P₂, sedangkan pertambahan bobot badan harian mencit (*mus musculus*) paling rendah yaitu 9,06 g/ekor/hari pada mencit P₃. Hal tersebut disebabkan oleh konsumsi pakan yang dapat mempengaruhi PBBH pada mencit yang diberikan tidak berbeda nyata karena pengukuran penambahan bobot badan pada ternak bisa dijadikan tolak ukur tingkat penggunaan pakan oleh ternak tidak hanya untuk kebutuhan hidup. Perbedaan PBB yang terjadi pada mencit bisa memberikan gambaran umum pengaruh mutu serta jumlah pakan yang dicobakan. Williamson dan Payne (1978) menyatakan bahwa jumlah serta mutu pakan yang dikonsumsi sangat berpengaruh terhadap PBB. Pada rataan pertambahan bobot badan hasil penelitian pada perlakuan P0, P1, P2 serta P3 secara berurutan ialah (9,32), (9,12), (9,32) dan (9,06) g/ekor/hari. Pemberian tepung kedelai terhadap pertambahan bobot badan mencit tidak berpengaruh nyata ($P>0.05$) terhadap pertambahan bobot badan mencit. Ini diduga karena pakan komersial yang diberikan telah memenuhi kebutuhan nutrisi mencit, dan pemberian sedikit tepung kedelai tidak mempengaruhi komposisi nutrisi pakan karena taraf pemberianya sedikit. Sedangkan menurut Rakhamadi dkk (2009), faktor yang mempengaruhi pertambahan bobot badan mencit salah satunya ialah faktor intern atau faktor genetik, sebesar apapun nutrisi yang diberikan maka apabila genetiknya dari keturunan kecil maka tidak akan berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan.

Parakkasi (1999) menyatakan jika hewan yang memiliki sifat serta kapasitas konsumsi yang lebih besar, maka produksinya juga cenderung akan lebih besar dibandingkan dengan hewan serupa dengan kapasitas ataupun sifat konsumsi rendah dengan ransum yang sama. Tingkat pertumbuhan ternak amat bergantung pada banyaknya jumlah nutrient yang dikonsumsi serta digunakan oleh ternak. Kecepatan tumbuh tiap jenis hewan akan berlainan, faktor yang dapat mempengaruhi salah satunya ialah generasi serta lingkungan. Pertumbuhan tiap komponen badan relatif mengikuti pola yang seragam dengan bobot badan hidup. Wodzicka-Tomaszewska et al (1993) menyatakan bahwa jumlah konsumsi ialah faktor terpenting yang menentukan jumlah nutrisi yang diterima oleh ternak serta kemudian berpengaruh pada pertambahan bobot badan. Dari hasil analisis ragam tentang pengaruh pemberian tepung kedelai pada pakan terhadap pertambahan bobot badan mencit (*mus musculus*) disajikan dalam tabel 4.

Tabel 4. Analisis ragam pertambahan bobot dan pada mencit.

SK	DB	JK	KT	F.hit	F.tabel
-----------	-----------	-----------	-----------	--------------	----------------

				5%	1%
Perlakuan	3	0,16	0,05		
Galat	8	0,83	0,1	0,52	4,07
Total	11	0,99			7,59

Keterangan: $F_{hitung} < F_{tabel}$ 0,05 artinya tidak berpengaruh nyata.

Berdasarkan analisis ragam dalam Tabel 4. diatas diketahui bahwa hasil Analisis Keragaman Pertambahan Bobot Badan mencit (*mus musculus*) adalah ($P>0,05$) tidak berbeda nyata karena $F_{hitung} < F_{tabel}$ (5%) artinya Terima H_0 dan Tolak H_1 . Hal ini menunjukan Tidak Terdapat Pengaruh substitusi tepung kedelai sampai pada tahap pemberian 15% dari konsentrat terhadap pertambahan bobot badan mencit.

National Research Council, (2006) menyatakan bahwa beberapa faktor yang berpengaruh terhadap PBB meliputi total protein yang didapat tiap harinya, usia, jenis ternak, kondisi tiap ternak keadaan genetis lingkungan, serta pengelolaan tatalaksana. Sedangkan Nursasih (2005) mengatakan bahwa kualitas serta kuantitas pakan, amat berpengaruh terhadap pertambahan bobot badan ternak ruminansia, dengan kata lain penilaian pertambahan bobot badan ternak berbanding lurus dengan ransum yang dikonsumsi.

4. Kesimpulan

Substitusi tepung kedelai sampai pada taraf 15%, tidak memberikan pengaruh nyata ($P>0,05$) terhadap pertambahan bobot badan serta jumlah konsumsi pada mencit (*Mus musculus*). 20

Pengaruh Pemberian Tepung Kedelai pada Pakan terhadap Pertambahan Bobot Badan Mencit

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- | | | | |
|--|---|---|----|
| | 1 | repository.unhas.ac.id | 2% |
| | | Internet Source | |
| | 2 | ojs.uho.ac.id | 1% |
| | | Internet Source | |
| | 3 | eksakta.ppj.unp.ac.id | 1% |
| | | Internet Source | |
| | 4 | www.ejournal-s1.undip.ac.id | 1% |
| | | Internet Source | |
| | 5 | Bella Florana, Elis Dihansih, Ristika Handarini.
"THE PERFORMANCE OF QUAIL STARTER-GROWER WHO WERE RATIONS ADDITIONAL CONTAINING GARLIC (<i>Allium sativum</i>) AND CARAWAY (<i>Cuminum cyminum</i>)", Jurnal Peternakan Nusantara, 2018 | 1% |
| | | Publication | |
| | 6 | docobook.com | 1% |
| | | Internet Source | |
| | 7 | journal.uniga.ac.id | 1% |

8

journal.unipdu.ac.id

1 %

9

budhy-mcn.blogspot.com

1 %

10

garuda.ristekbrin.go.id

1 %

11

www.pustakadunia.com

1 %

12

Melkianus Sanan. "Pengaruh Variasi Pakan Sumber Energi terhadap PBBH, Konsumsi dan Konversi Ransum Kambing Kacang Jantan", JAS, 2018

1 %

Publication

13

Heryanto . ., K Maaruf, S S Malalantang, M R Waani. "PENGARUH PEMBERIAN RUMPUT RAJA (*Pennisetum purpupoides*) DAN TEBON JAGUNG TERHADAP PERFORMANS SAPI PERANAKAN ONGOLE (PO) BETINA", ZOOTEC, 2015

1 %

Publication

14

eprints.uns.ac.id

1 %

Internet Source

15

Submitted to Universitas Airlangga

16	docplayer.info Internet Source	1 %
17	Submitted to Udayana University Student Paper	1 %
18	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
19	usnsj.com Internet Source	1 %
20	unsri.portalgaruda.org Internet Source	<1 %
21	Submitted to University of Muhammadiyah Malang Student Paper	<1 %
22	journal.uny.ac.id Internet Source	<1 %
23	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
24	Merry Simanjuntak. "PENGARUH PENAMBAHAN TEPUNG DAUN KEMANGI (Acimum spp) DALAM PAKAN TERHADAP PERFORMANS AYAM BROILER", JURNAL HUTAN PULAU-PULAU KECIL, 2017 Publication	<1 %

-
- 25 Yovita Florida Seran, Charles V. Lisnahan, Theresia I. Purwantiningsih. "Pengaruh Penambahan Probiotik dalam Pakan terhadap Pertambahan Berat Badan, Konsumsi Pakan dan Konversi Pakan Ayam Broiler", JAS, 2019
Publication
-
- 26 es.scribd.com <1 %
Internet Source
-
- 27 www.scribd.com <1 %
Internet Source
-
- 28 media.neliti.com <1 %
Internet Source
-
- 29 kumpulantugas466.blogspot.com <1 %
Internet Source
-
- 30 e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 31 ejournal-s1.undip.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 32 repository.radenintan.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 33 Arnold Baye, F. N. Sompie, Betty Bagau, Mursye N. Regar. "PENGGUNAAN TEPUNG LIMBAH PENGALENGAN IKAN DALAM RANSUM TERHADAP PERFORMA BROILER", ZOOTEC, 2015 <1 %

34

jurnal.untad.ac.id

Internet Source

<1 %

35

Shofiyah S, Sarengat W, Muryani R. "Pengaruh Penggunaan Tepung Kulit Singkong Terfermentasi Dalam Ransum Terhadap Performans Puyuh Jantan (The Effect Of Fermented Cassava Peel Meal In Diet On Male Quail Performance)", Jurnal Pengembangan Penyuluhan Pertanian, 2019

<1 %

Publication

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off