

# Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Buah Naga (*Hylocereus undatus*) Sebagai Feed Additive dalam Pakan Terhadap Berat Karkas Ayam Broiler

*by* Rumah Publikasi Ilmiah

---

**Submission date:** 01-Dec-2020 01:42PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1461172323

**File name:** Animal\_Science\_Nur\_Kholis\_2018.doc (172K)

**Word count:** 1835

**Character count:** 10777



Available online

Journal Page is available to <http://animalsciencejournal.unisla.ac.id/index.php/asj/index>.

## **Effect of Addition of Dragon Fruit Skin Flour (*Hylocereus undatus*) as Feed Additive in Feed on Weight of Broiler Chicken Carcass**

<sup>1</sup>

### **Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Buah Naga (*Hylocereus undatus*) Sebagai Feed Additive dalam Pakan Terhadap Berat Karkas Ayam Broiler**

Nur Kholis<sup>1</sup>, Dyanovita Alkurnia<sup>2\*</sup>, Edy Susanto<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Islam Lamongan  
Jl. Veteran No. 53 Lamongan  
e-mail: [dyanovita\\_alkurnia@yahoo.com](mailto:dyanovita_alkurnia@yahoo.com)

#### **INFO ARTIKEL**

##### **Sejarah artikel:**

Diterima 24 Nopember 2019  
Direvisi 20 Desember 2019  
Diterima 30 Desember 2019  
Online 01 Januari 2020

##### **Kata kunci:**

Kulit Buah Naga,  
Karkas,

*Feed Additive*

##### **Keyword:**

*Dragon Fruit Leather,*  
*Carcass,*  
*Feed Additive*

##### **APA style in citing this article:**

N. Kholis, D. Alkurnia dan E. Susanto, "Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Buah Naga (*Hylocereus undatus*) Sebagai Feed Additive dalam Pakan Terhadap Berat Karkas Ayam Broiler", International Journal of Animal Science: Vol. 03 (01) 2020 Halaman 1-5.

#### **ABSTRAK**

Penelitian dilakukan selama 1 bulan yakni pada bulan Mei hingga Juni di kandang ayam Broiler peternakan rakyat milik Bapak Jumajak yang berlokasi di Desa Sambangrejo Kecamatan Modo Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung kulit buah naga sebagai feed Additive dalam pakan terhadap berat karkas ayam broiler. Kegunaan dari penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan pemanfaatan limbah kulit buah naga menjadi feed Additive produk peternakan yang ekonomis. Materi memakai ayam broiler umur sehari (*Day Old Chick/DOC*) sebanyak 60 ekor. Variabel pengamatan ialah berat karkas ayam broiler. Analisis data yang digunakan ialah analisis statistic Rancangan Acak Lengkap. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengaruh penambahan tepung kulit buah naga (*Hylocereus Undatus*) sebagai feed additive dalam pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata ( $p>0.05$ ) terhadap berat karkas ayam broiler. Akan tetapi penambahan berat karkas pada ayam broiler yang mengkonsumsi feed additive tepung kulit buah naga lebih tinggi daripada kontrol.

#### **ABSTRACT**

The research was conducted for one month, from May to June, in Mr. Jumajak's smallholder broiler chicken coop, located in Sambangrejo Village, Modo District, Lamongan Regency. The research objective was to determine the effect of adding dragon fruit peel flour as a feed additive to broiler chickens' carcass weight. This research is expected to be able to develop the utilization of dragon fruit peel waste into economical feed additives for livestock products. The material uses 60-day old broilers (Day Old Chick / DOC). The observation variable is the carcass weight of broiler chickens. The data analysis used was a statistical analysis of a completely randomized design. The results showed that the effect of adding dragon fruit peel flour (*Hylocereus Undatus*) as a feed additive in the feed did not have a significant impact ( $p> 0.05$ ) on the carcass weight of broiler chickens. However, the increase in carcass weight in broiler chickens consuming additional feed of dragon fruit peel flour was higher than the control.

© 2020 Animal Science with CC BY SA license.

<sup>1</sup>

**Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Buah Naga (*Hylocereus undatus*) Sebagai Feed Additive dalam Pakan Terhadap Berat Karkas Ayam Broiler**

© 2020 International Journal of Animal Science with CC BY SA license.

## 1. Pendahuluan

7 Ayam ras pedaging atau yang biasa disebut broiler ialah jenis ras unggulan hasil dari persilangan ayam-ayam yang mempunyai daya produksi tinggi, utamanya dalam hal produksi daging ayam.

Di Indonesia, penyediaan pakan ternak unggas kini masih menghadapi hambatan, antara lain masih tingginya komponen penyusun pakan berupa pakan impor serta ketersediaan pakan yang tidak terus menerus ada sepanjang tahun. Kondisi kualitas bahan pakan juga masih memprihatinkan karena umumnya bahan pakan kurang berkualitas dan belum ada standarisasi kualitas bahan pakan. Pakan ternak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap produksi dan produktifitas ternak, karena mempunyai kontribusi sebesar 70-80% terhadap keseluruhan biaya produksi. Sektor pertanian merupakan penghasil limbah terbesar terutama dari sub sektor perkebunan salah satu komoditi yang lembahnya belum termanfaatkan adalah buah naga, dimana didalamnya terkandung zat warna alami antosianin cukup tinggi dan antioksidan.

Feed Additive ialah bahan makanan lengkap yang digunakan sebagai sumber penyedia vitamin, mineral serta antibiotika. Penambahan feed additive dalam pakan ditujukan untuk memperoleh pertumbuhan ternak yang maksimal.

Karkas ialah bagian tubuh hasil dari penyembelihan sesudah dikurangkan darah, kepala, kedua kaki pada bagian bawah (dimulai dari carpus dan tarsus), kulit, sistem pencernaan, usus, jantung, tenggorokan, paru-paru, limpa serta hati, namun untuk ginjal kerap dimasukkan kedalam karkas. Untuk menilai karkas yang dipasarkan, faktor utama yang perlu diperhatikan ialah bobot karkas, dan potongan karkas yang dapat dijual. Kualitas karkas ialah nilai karkas yang dihasilkan ternak relative terhadap suatu situasi pemasaran. Penambahan tepung kulit buah naga sebagai feed additive pada pakan ternak diharapkan dapat membentuk antibody yang mampu meningkatkan mutu kualitas karkas ayam broiler sehingga pemeliharaan ayam broiler dapat optimal dan dapat diperoleh hasil yang memuaskan.

## 2. Metode

Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan yakni selama bulan Mei hingga Juni 2017, di kandang Ayam Broiler peternakan rakyat milik Bapak Jumajak yang berada dibawah naungan kemitraan PT. Ciomas Adisatwa. Kandang ini berada di Desa Sambangrejo Kecamatan Mogo Kabupaten Lamongan. Ternak yang dipakai yakni ayam broiler umur sehari (*Day Old Chick / DOC*) jenis strain cobb sejumlah 60 ekor tanpa dilakukan pemisahan antara jantan dan betina (*Unsex*) yang dipelihara selama 32 hari. Kandang yang dipakai ialah kandang *type open house* dengan alas panggung serta atap dari asbes. Ayam dipelihara didalam kandang yang dibuat sekat serta didalamnya ada 10 kotak kecil dengan ukuran 1x1 meter. Ayam terbagi kedalam 4 perlakuan, tiap perlakuan terdiri atas 3 ulangan serta tiap ulangan terdiri atas 5 ekor ayam.

Peralatan yang dipakai yakni tempat air minum serta tempat ransum. Adapun peralatan lainnya yakni plastik atau tirai penutup, lampu, kertas koran, sekam, gayung serta baskom. Pengukuran berat karkas memakai timbangan digital. Pakan yang dipakai yakni pakan komersial SB-10, SB-11, dan SB-12 produksi PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk sebagai pakan kontrol. Pakan perlakuan yakni pakan komersial dengan penambahan tepung kulit buah naga dalam taraf 0,6%, 0,8% dan 1%.

Proses pembuatan tepung kulit buah naga ini yaitu kulit diiris tipis dan dijemur hingga kering lalu di tumbuk hingga halus dan berbentuk tepung. Pemberian pakan dua kali dalam satu hari yakni pukul 07.00 serta 16.00 WIB dan air minum diberikan secara *ad libitum*, artinya diberikan terus menerus tidak berbatas waktu.

Penelitian memakai Rancangan Acak Lengkap (RAL) pola searah. Tingkat pemberian tepung kulit buah naga dalam pakan ayam broiler dibagi dalam 4 perlakuan. Perlakuan meliputi 4 taraf pemberian tepung kulit buah naga yakni :

P0 : Pakan komersial tanpa penambah tepung kulit buah naga

P1 : Pakan komersial + 0,6% tepung kulit buah naga

P2 : Pakan komersial + 0,8% tepung kulit buah naga

P3 : Pakan komersial + 1% tepung kulit buah naga

Tiap taraf perlakuan mendapatkan 4 ulangan dengan tiap ulangan terdiri atas 5 ekor ayam. Model matematika dari rancangan percobaan seperti dibawah ini:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \epsilon_{ij}$$

$\mu$  : Nilai rerata sesunguhnya

$\alpha_i$  : Pengaruh perlakuan taraf pemberian tepung kulit buah naga

$\epsilon_{ij}$ : Pengaruh galat percobaan akibat perlakuan ke-i pada satuan percobaan ke-j (j:1,2)

Perubahan yang diamati meliputi berat karkas yang didapat melalui cara menimbang ayam broiler yang sudah disembelih dikurangkan dengan berat darah, kepala, ekor, kulit, kedua kaki, jeroan serta bobot seluruh organ dalam. Berat karkas dinyatakan dalam g/ekor.

Data di analisa secara statistika dengan Anova, bila ada perbedaan antar perlakuan maka dilaksanakan uji jarak berganda duncan (UJBD).

Metode pembuatan tepung kulit buah naga dilakukan dengan cara kulit dari buah naga diiris tipis serta dijemur dibawah cahaya matahari selama 2 hari, kemudian dioven selama 1 jam dengan temperatur 60°C. Kemudian, kulit buah naga yang sudah kering ditumbuk sampai lembut dan membentuk tepung serta dicampurkan dengan pakan komersial sesuai taraf perlakuan masing-masing.

Menghitung bobot karkas dilakukan dengan cara penyembelihan (*Slaughtering*) yakni memotong arteris karotis, vena jugularis, oesophagus, serta trachea. Ketika disembelih darah musti keluar sebanyak-banyaknya, setelah darah keluar dengan banyak lalu dilakukan perendaman (*Scalding*). Perendaman dilaksanakan di air panas dengan temperatur 65-80°C dengan lama 5 hingga 30 detik. Setelah itu dilakukan pencabutan bulu dan pengeluaran jeroan (*Eviscerating*) mulai dari tembolok, trachea serta kelenjar minyak bagian ekor dipisahkan, selanjutnya dibuka rongga badan dengan mengiris dari kloaka kearah tulang dada. Kloaka serta visera atau jeroan dikeluarkan selanjutnya dipisahkan organ-organ meliputi hati, empedu, serta jantung. Isi empedal musti dikeluarkan, begitu juga empedal musti dipisah dari bawah columna vertebralis. Kepala, leher, serta kaki dipisahkan pula. Berat karkas didapat dari bobot hidup dikurangkan dengan bobot kepala, kaki, bulu, serta organ dalam kecuali giblet (jantung, hati, serta gizzard).

### 3. Hasil dan Pembahasan

Karkas ayam ialah bobot badan ayam sesudah disembelebih dikurangkan dengan kepala, kaki, darah, bulu serta organ dalam, komponen karkas terdiri dari otot, lemak, tulang serta kulit. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap persentase bobot karkas ialah bobot hidup, perlemakan, jenis kelamin, usia serta kegiatan.

<sup>2</sup>  
Tabel 1. Data Berat Karkas Ayam Broiler yang Diberi Tepung Kulit Buah Naga sebagai Feed Additive (gr/ekor/hari).

Perlakuan	Ulangan			Jumlah	Rataan
	1	2	3		
P <sub>0</sub>	1300	1402	1405	4107	1369
P <sub>1</sub>	1304	1403	1406,1	4113,1	1371
P <sub>2</sub>	1403	1406	1408	4217	1405,6
P <sub>3</sub>	1409	1411	1415	4235	1411,6

Berdasarkan hasil uji statistik serta data pada tabel 1 dapat dilihat bahwa rataan berat karkas dari yang terkecil hingga paling tinggi, yakni ; P<sub>0</sub> (Pakan komersial tanpa penambahan tepung kulit buah naga) dengan rataan berat karkas paling rendah sebesar 1369 gr, P<sub>1</sub> (pakan komersial + tepung buah naga 0,6%) sebesar 1371gr, P<sub>2</sub> (pakan komersial + tepung buah naga 0,8%) sebesar 1405,6 gr, dan P<sub>3</sub> (pakan komersial + tepung buah naga 1%) dengan rataan paling tinggi sebesar 1411,6 gr. Hasil analisis pada tabel 1 diatas memperlihatkan tidak terdapat perbedaan yang nyata ( $P>0,05$ ) terhadap pertambahan berat karkas ayam Broiler. Pertambahan berat karkas pada perlakuan P<sub>3</sub> atau dengan pemberian 1% tepung kulit buah naga merupakan pertambahan berat karkas tertinggi dibanding

<sup>2</sup>dengan penambahan tepung kulit buah naga yang lain. Ini karena pada perlakuan P<sub>3</sub> mengkonsumsi ransum yang tinggi juga.

Tabel 2. Hasil Statistik ANOVA Berat Karkas Ayam Broiler yang Diberi Tepung Kulit Buah Naga

Scors	DB	JK	KT	Fhitung	FTabel
Perlakuan	3	4541,67	1513,89	0,8699	4,07
Galat	8	13922,34	1740,30		
Total	11	18464,01			

Sumber: Data Primer yang Telah Diolah (2017)

Pemberian *feed additive* tepung kulit buah naga diharapkan dapat menaikkan konsumsi ransum sebab didalamnya mengandung vitamin C yang dapat menurunkan stress sebagai dampak dari temperatur panas pada lingkungan, sehingga jumlah pakan yang dikonsumsi akan lebih banyak. Sependapat dengan Subekti (2012) bahwa pemberian aditif vitamin C mampu mengurangi cekaman panas sehingga tidak akan mengganggu konsumsi ransum. Tidak hanya vitamin C, vitamin B berguna dalam pembentukan energi yang bisa memperbaiki saluran pencernaan serta akan menambah nafsu makan. Menurut Patwary dkk., (2013) dalam Wahyu (2015) kulit buah naga merah memiliki kandungan vitamin B yang bermanfaat untuk menambah nafsu makan. Akan tetapi, hasil penelitian memperlihatkan tidak berpengaruh nyata ( $P>0,05$ ) pada berat karkas sebab dosis pemberian aditif tepung kulit buah naga yang masih sedikit menjadi sebab asupan vitamin B serta vitamin C tidak berpengaruh terhadap cekaman panas.

#### 4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penambahan tepung kulit buah naga (*Hylocereus Undatus*) sebagai *feed additive* dalam pakan tidak memberikan pengaruh yang nyata ( $P>0,05$ ) terhadap berat karkas ayam *Broiler*. Akan tetapi pertambahan berat karkas pada ayam *Broiler* yang mengkonsumsi pakan *feed additive* tepung kulit buah naga lebih tinggi dari pada kontrol. Ini karena pada perlakuan P<sub>3</sub> mengkonsumsi ransum yang tinggi.

# Pengaruh Penambahan Tepung Kulit Buah Naga (*Hylocereus undatus*) Sebagai Feed Additive dalam Pakan Terhadap Berat Karkas Ayam Broiler

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

- |   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | repository.ub.ac.id<br>Internet Source   | 5% |
| 2 | media.neliti.com<br>Internet Source  | 3% |
| 3 | ejournal.urindo.ac.id<br>Internet Source   | 3% |
| 4 | repo.unand.ac.id<br>Internet Source  | 2% |
| 5 | unkripjournal.com<br>Internet Source   | 2% |
| 6 | repository.ipb.ac.id<br>Internet Source  | 1% |
| 7 | Iche Ariesta. "Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Terhadap Kinerja Peternak Ayam Ras Pedaging", JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan), 2017 | 1% |

- 8 Yusuf Mahlil, Husmaini ., Warnita ., Mirzah ., Maria Endo Mahat. "Using Physical and Chemical Methods to Improve the Nutrient Quality of Dragon Fruit (*Hylocereus polyrhizus*) Peel for Use as Feed for Laying Hens", International Journal of Poultry Science, 2018  
Publication
- 
- 9 [jurnalpeternakan.unisla.ac.id](#) 1 %  
Internet Source
- 
- 10 [id.123dok.com](#) 1 %  
Internet Source
- 
- 11 [123dok.com](#) 1 %  
Internet Source
- 
- 12 [savana-cendana.id](#) <1 %  
Internet Source
- 
- 13 [jurnalmahasiswa.unesa.ac.id](#) <1 %  
Internet Source
- 
- 14 [zombiedoc.com](#) <1 %  
Internet Source
- 
- 15 [repository.unair.ac.id](#) <1 %  
Internet Source
-

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off